

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO: Janeiro a dezembro



Figura 1- Foto: Fazenda e Haras São Vicente.

Produzido por José Carlos Ribeiro.
Boi Saúde - Pecuária Inteligente.
Especialista em Gestão de Agronegócios pela Esalq/USP.

JANEIRO

- Época de estação de monta.
- Proteção contra Ectoparasitas: na época das águas.

FEVEREIRO

- Febre Aftosa: de acordo com a defesa sanitária animal.
- Raiva: vacinar aos quatro meses e anualmente em áreas de risco.
- Proteção contra Ectoparasitas: na época das águas.



Figura 2- Foto: Rubens Ferreira/@fotodeboi

MARÇO

- Desmame de bezerros.
- Brucelose: vacinar as fêmeas entre três e oito meses de idade.
- Clostridioses:
 - 1^a dose – entre os quatro a seis meses de idade.
 - 2^a dose – seis meses após a primeira aplicação.

ABRIL

- Desmame de bezerros.
- Brucelose: vacinar as fêmeas entre três e oito meses de idade.
- Clostridioses:
 - 1^a dose – entre os quatro a seis meses de idade.
 - 2^a dose – seis meses após meses após a primeira aplicação.



Figura 3- Foto: Campo Fácil

MAIO

- Desmame de bezerros.
- Febre Aftosa: de acordo com a defesa sanitária animal do seu Estado.
- Verminose: dosificar do desmame aos dois anos e cinco meses de idade.

JUNHO

- Nenhuma ação necessária.



Figura 4 - Foto: Boy Fotógrafo

JULHO

- Época de preparação para nascimento de bezerros;
- Diarreias: vacinar vacas e bezerros contra os agentes envolvidos nos surtos identificados;
- Verminose: dosificar do desmame aos dois anos e cinco meses de idade.

AGOSTO

- Época de nascimento de bezerros;
- Corte e cura do umbigo: ao nascimento – imersão em iodo a 10%.
- Colostro: oferecer até seis horas após o nascimento.
- Para a preparação para a monta:
 - Brucelose: vacinar as fêmeas entre três e oito meses de idade;
 - Tricomonose: descarte dos machos e descanso das fêmeas;
 - Campilobacteriose: descarte dos machos e vacinar fêmeas;
 - Leptospirose: vacinar as fêmeas em situações de risco;
 - Rinotraqueite infecciosa bovina (IBR) / Diarreia bovina a vírus (BVD): vacinar 60 dias antes da monta em rebanhos que apresentarem o problema.

SETEMBRO

- Época de nascimento de bezerros;
- Corte e cura do umbigo: ao nascimento – imersão em iodo a 10%;
- Colostro: oferecer até seis horas após o nascimento;
- Proteção contra Ectoparasitas: na época das águas.

- Verminose: dosificar do desmame aos dois anos e cinco meses de idade.



Figura 5- Foto: Reprodução Internet

OUTUBRO

- Época de nascimento de bezerros;
- Diarreias: vacinar vacas e bezerros contra os agentes envolvidos nos surtos identificados;
- Corte e cura do umbigo: ao nascimento – imersão em iodo a 10%
- Colostro: oferecer até seis horas após o nascimento.
- Proteção contra Ectoparasitas: na época das águas.

NOVEMBRO

- Época de estação de monta;
- Diarreias: vacinar vacas e bezerros contra os agentes envolvidos nos surtos identificados;
- Febre Aftosa: de acordo com a defesa sanitária animal do seu Estado;
- Proteção contra Ectoparasitas: na época das águas.

DEZEMBRO

- Época de estação de monta
- Proteção contra Ectoparasitas: na época das águas.

Referência:

EMBRAPA, Calendário sanitário de gado de corte. [S. l.]. Disponível em: <https://old.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc72/anexo.html>.

Acesse:



Youtube: <http://youtube.com/boisaude/>



Blog: <https://dicas.boisaude.com.br/>



Instagram: <https://www.instagram.com/boisaude/>



Facebook: <https://facebook.com/boisaude/>

Continue acompanhando a Boi Saúde, com dicas diárias sobre pecuária de corte e pecuária de leite. Vamos juntos fazer do Brasil o maior produtor de carne do mundo.